



Terhességmegszakítás

Dr. Timmermann Gábor

*„Megszülettünk hirtelen
Egyikünk se kérte
Kérve kérünk szép
jelen
Meg ne büntess érte.”*

(Devecseri Gábor)

Terhességmegszakítás

- Művi vetélés = abortus artificialis (ab. artef.) = interruptio graviditatis (interruptio)
- 2004-ben kb. 56.000 abortusz
- Élveszületések/abortuszok száma= 100/60
- Rekord: 1970-ben kb. 192.000 abortusz!
- Magyarországon 1956 óta legális, azóta kb. 5,5 millió terhességmegszakítást végeztek!

18
ed
ed

803







Kérdés: Magánügy-e az aborusz?

Terhességmegszakítás indikációi

■ Orvosi:

- Anya egészségét veszélyeztető állapot
- Magzat élettel összeegyeztethetetlen betegsége, fejlődési rendellenessége
- Magas (10 % feletti) genetikai vagy teratológiai kockázat

■ Anya döntése:

- Ált. szociális indokok
- Fiatalkorúak terhessége
- Nők önrendelkezési joga
- Erőszakos nemi közösülés utáni terhesség
- A terhes nő korlátozottan cselekvőképes

Jogi szabályozás I.

- Megállapítás: csak szülész-nőgyógyász
- 12. hétig az anya dönthet (apa beleegyezése nem szükséges ☹!)
- „Anya súlyos válsághelyzete”
- 13-18. hétig:
 - Bűncselekményből adódó terhesség
 - A terhes cselekvőképtelen
 - Fiatalkorú terhes (18. életévét még nem töltötte be) → csak szülő vagy gondviselő engedélyével!
 - A terhesnek nem felróható okból nem történt meg 12. hét előtt.

Jogi szabályozás II.

- Magzat súlyos betegsége esetén: 20. hétig, maximum 24. hétig
- Élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenesség: bármikor javasolható
- Engedélyezési folyamat: Terhesség megállapítása → Területileg illetékes védőnő → CsVSz → Engedély → Jelentkezés a kórházban → Interruptio

Technikai kivitelezés

■ 6. terhességi hétig:

- *“Menstruációs szabályozás”*
- *Korai gyógyszeres eljárások*

■ 6-12. terhességi hétig:

1. tágítás: mechanikus (Hegar pálcasor), ozmotikus (laminária), kémiai (Rivanol, prosztaglandin)
2. Kiürítés: curettage-méhkaparás, vacuum

- 12-24. terhességi hétig:

- Vetélés indukció

- Méhszáj érlelés, tágítás (laminária, prosztaglandin) → oxytocinos inf. → vetélés
→ műszeres befejezés

- 24. hét felett : koraszülés indukció

Szövődmények:

- A terhességi kor előrehaladtával nő a beavatkozás kockázata
- Méhfal perforáció: komoly vérzést, esetleg csonkoló műtétet eredményez.
- Magzatrész visszamaradása: vérzést, lázat, gyulladást okoz.
- Fertőzés.
- Nyakcsatorna sérülése: tág cervix állandó folyást, krónikus gyulladást okoz, újbóli terhessége vetéléshez, koraszüléshez vezet.
- Meddőség: esetleges méheltávolítás, Ashermann-szindróma (méhfal összenövés), krónikus gyulladás okozta szövődmények.
- Rh-szenzibilizáció
- Lelki következmények.

A nemkívánt terhesség okai:

- Alkalmi vagy normál partnerkapcsolatban a védekezés teljes hiánya.
- Promiszkuitás nem megfelelő védekezés mellett.
- Normál partnerkapcsolatban védekezés nem kielégítő hatásfokkal.
- Fiatalkori prostitúció.
- Gyengeelméjűek terhessége.
- Nemi aktus csökkent ítélőképesség mellett (alkohol, drog stb. hatása alatt), védekezés nélkül.
- Nemi erőszak.

Terhességmegszakítások száma a nők korcsoportja szerint 1998-ban

Korcsoport	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-
Megszakítások száma	9 579	17 969	15 484	12 275	8 714	4 950

Terhességmegszakítások száma a nők iskolai végzettsége szerint 1997-ben

Elvégzett osztályok száma	0	1-3	4-5	6-7	8	9-12	13-
Megszakítások száma	241	384	1082	2559	41 653	21 450	7008

Terhességmegszakítások száma az élő gyermekek száma szerint 1997-ben

Élő gyermekek száma	0	1	2	3-
Megszakítások száma	20 840	16 823	22 178	14 722

Terhességmegszakítások száma a nők családi állapota szerint 1997-ben

Családi állapot	Hajadon	Házias	Özvegy	Elvált
Megszakítások száma	29 173	37 596	802	6 906

Terhességmegszakítások száma a nők előző terhességmegszakításainak száma szerinti csoportosításban 1997-ben

Előző abortuszok száma	0	1	2	3	4
Megszakítások száma 1997-ben	40 303	19 770	8 046	3 266	3 175

Megoldás = megelőzés

- Hatékony fogamzásgátlás (esetleg támogatott tablettá, gumióvszer?)
- Megfelelő felvilágosítás
- Magzati élet „becsületének” helyreállítása
- Családtervezési szándék növelése
- Korszerűbb anyasági támogatási rendszer

Fogamzásgátlási módszer	Terhességi ráta
Fogamzásgátlás nélkül	80-90
Méhszájsapka (Cervixsapka)	8-18
Megszakított közösülés (Coitus interruptus)	12-42
Óvszer	3-15
Injekciós készítmények	0,7-5,0
Spirál (IUD)	0,5-5,0
Kombinált tableta	0,1-2,0
Hüvelyöblítés	25-45
Minipill (Postinor)	1,5-5,0
Naptármódszer	14-47
Nyákteszt (Billings-módszer)	1,4-26
Pesszárium	10-20
Műtéti sterilizáció	0,3-6,0

Legjobb fogamzásgátlási lehetőségek serdülők számára

Legmegfelelőbb	Kondom (+spermicid) Petting Orális fogamzásgátló
Elfogadható	Pesszárium Spermicidek Fogamzásgátló injekció
Kevésbé elfogadható	IUD Periodikus absztinencia
Vészhelyzetben	Postcoitalis fogamzásgátlás

Vannak-e az embriónak-
magzatnak jogai?