

Tájékoztató a nőgyógyászati nagyműtétekhez

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a nőgyógyászati nagyműtétek esetén szükséges információkról és adjunk néhány praktikus tanácsot a várható történésekhez.

Műtéthez szükséges kivizsgálás:

- EKG (2 hónapnál nem régebbi)
- labor (vérkép, általános vizelet, máj- és vesefunkció, véralvadás) (1 hónapnál nem régebbi)
- terhességi teszt (2 hétnél nem régebbi)
- vércsoport, ellenanyag (1 hónapnál nem régebbi)
- mellkas röntgen (2 hónapnál nem régebbi)
- Meddőségi vizsgálatnál: hormon-, partner spermavizsgálati lelete
- aneszteziológiai konzílium (**Bejelentkezés: 20/825-08-38** Helyszíne: II. Női Klinika Ambulancia)

Kórházi felvétel:

A kórházi felvételre a megbeszéltt műtét előtti napon 8:00-kor jelentkezzék a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (1084 Budapest Üllői út 78/a) alagsori Betegfelvételi Irodáján, éhgyomorral. A felvételnél az adminisztráció után elfoglalhatja ágyát, majd a reggeli vizitnél főorvosi bemutatás és a műtét véglegesítése történik. Ezek után az altató orvosa vagy az osztályunk belgyógyásza vizsgálja meg.

A műtétet megelőző napon csak egy könnyű vacsorát, éjszaka után már csak kevés szénsavmentes vizet fogyaszthat, majd reggel 6 órától semmit! Akinek bélelőkészítés szükséges, előző nap déltől nem lehet. Cukorbeteg esetén az inzulinadag módosítását előzetesen egyeztetni kell.

Kérjük, hogy a műtét felvételnél a beutalóját, minden elkészült és korábbi leleteit egy dossziében hozza magával!

Amennyiben rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, hozza magával és a műtét napján egy korty vízzel vegye be a szükséges orvosságokat.

A műtéthez előzetesen altesti borotválást ajánlott otthon elvégezni.

Az alábbi gyógyszerek szedésének módosítására lesz szükség, melyet a műtét előtt meg kell beszélni:

- szájon át szedett antidiabetikumokat (vércukor csökkentő gyógyszerek) a műtéteti időszakban inzulinra kell váltani

- szájon át szedett antikoagulánsokat (véralvadást csökkentő, ún. „vérhígító” gyógyszerek, pl. Syncumar, Warfarin) a műtéti időszakban injekciós heparin készítményekre kell váltani
- fogamzásgátló tabletták vagy klimaxban hormonpótló készítmények szedését fel kell függeszteni
- rendszeresen szedett nem szteroid gyulladáscsökkentők (Pl. Algopyrin, Demalgonil, Panadol stb.) szedését mellőzni kell a műtét előtti egy hétben!
- minden rendszeresen szedett gyógyszer alkalmazását beszéljük át műtét előtt!

A kórházi benntartózkodás idejére az alábbiakra lesz feltétlenül szüksége:

- hálóing, köntös
- váltás fehérnemű
- tisztasági betétek
- tisztasági felszerelés, zsebkendő, WC-papír
- papucs, törölköző
- szénsavmentes ásványvíz, pohár, evőeszközök (tányér nem szükséges) Bár az osztályon zárt szekrényben elhelyezheti holmiját, mégis kérjük, hogy értékeit ne hozza magával! A műtétes időszak idejére lehetőség van magasabb szállodai szolgáltatást nyújtó ún. „alapítványi szobában” történő elhelyezésre, mely térítés mellett előzetes egyeztetéssel lehetséges. Kérjük felvételkor ezt az igényét előre jelezze!

www.timmermann.hu